

Алгоритмы действий медперсонала в разных аварийных ситуациях

для профилактики ВИЧ-инфекции



При проколе (порезе)

1. Немедленно снять перчатки
2. Вымыть руки с мылом под проточной водой
3. Обработать ранку 70% спиртом, кровь не выдавливать
4. Смазать ранку 5% спиртовым р-ром йода
5. Заклеить лейкопластырем

При пропадании биологических жидкостей на кожные покровы

1. Обработать кожу 70% спиртом
2. Обмыть водой с мылом
3. Повторно обработать 70% спиртом

При попадании биологической жидкости на слизистую

1. Рот и горло прополаскивают большим количеством воды;
2. Слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой

НЕ ТЕРЕТЬ!

! Больше не нужно полоскать рот 70-% раствором этилового спирта

При попадании биологической жидкости на пол (бой пробирки)

1. Место разлива накрыть ветошью, обильно смоченной дезсредством (экспозиция 1 час)
2. Все собрать и вместе с ветошью поместить в емкость для отходов класса Б
3. Повторно накрыть место аварии ветошью с дезраствором (экспозиция 1 час)
4. Через час сбросить ветошь в ёмкость с отходами класса Б
5. Сделать уборку кабинета по типу